



Ендодонтичне ЛІКУВАННЯ кореневих КАНАЛІВ



Ендодонтичне лікування кореневих каналів - це високоточна мікрохірургічна процедура, метою якої є видалення інфекції з каналів у середині зуба. Як будь яке хірургічне втручання - ендодонтичне лікування має свої ризики на наслідки.


Рекомендації після проведення ендодонтичного лікування (лікування кореневих каналів)



- Не вживати їжу до закінчення дії анестезії, щоб уникнути травми язика і губ;
- Не прогрівати область лікованого зуба;
- Виключити в перші три доби після лікування відвідування лазні, сауни і уникати переохолодження;
- При болях і загостренні прийняти знеболюючий засіб, за інструкцією рекомендованою Вашим лікарем;
- Не спати на стороні лікованого зуба (відбувається нагрівання ділянки);
- Повторна рентген-діагностика через 6 - 8 місяців;
- Не вживати тверду їжу на стороні втручання, оскільки поки зуб повністю не відновлений - він крихкий;
- Зуб необхідно відновити протягом одного місяця, інакше виникне загроза його зруйнування, або повторного інфікування;
- У деяких випадках необхідне тимчасове протезування на 6 місяців.

Після повного усунення запалення в зубі можна проводити постійне протезування

Що є нормою і не повинно викликати занепокоєння пацієнта:



- Незначні мимовільні болі в перші 1-5 днів після лікування.
- Хворобливість при накушуванні до 2-ох тижнів після лікування.
- Тимчасова пломба може дещо "просісти" чи кришитися.

Коли слід негайно зв'язатись з лікарем:



- Поява набряку м'яких тканин обличчя або слизової в області пролікованого зуба
- Значне підвищення температури тіла
- Якщо болі тривають більше 2-ох тижнів.

Медикаменти для внутрішнього прийому (при призначенні лікарем)



Антибактеріальні препарати (приймати після їжі):

- Аугментин (625 мг) - по 1 таблетці 3 рази на день, курс прийому 5 днів
- Амоксицилін (250 мг/500 мг) - по 1 капсулі 3 рази на день, курс прийому 5-7 днів
- Лінекс (пробіотик) при потребі

Протизапальні препарати:

- Німесил (100мг) - по 1 порошку 2-чі на день, курс прийому 3-5 днів, після їжі;
- Ібупрофен (400 мг) - по 1 таблетці 2-чі на день, курс прийому 3-5 днів, після їжі
- Парацетамол (500 мг) та Ібупрофен (400 мг) - дозування назначає лікар

Знеболюючі препарати:

- Кетанов (10мг) - по 1 таблетці при болях;

