



Мені встановлено ІМПЛАНТ




Що може виникати?



- незначна слабкість
- оніміння після використання місцевої анестезії (протягом 4-6 годин)
- відчуття тиску на ясна у місці імплантації
- набряк щоки, помірний ниючий біль у місці імплантації
- підвищена температура тіла (до 38)

Як поліпшити свій стан?



- відпочиньте вдома, уникайте фізичних навантажень;
- не вживайте їжу перші 3-4 години після операції;
- не приймайте гарячу ванну, це може спровокувати кровотечу;
- накладити холодний компрес для зменшення набряку (на зовнішню сторону щоки)
- намагайтеся не жувати на сторону, де було встановлено імплант

Медикаменти для внутрішнього прийому




Антибактеріальні препарати (приймати після їжі):

- Аугментин (625 мг) - по 1 таблетці 3 рази на день, курс прийому 5 днів
- Амоксицилін (250 мг/500 мг) - по 1 капсулі 3 рази на день, курс прийому 5-7 днів

Протизапальні препарати:

- Німесил (100мг) - по 1 порошку 2-чі на день, курс прийому 3-5 днів, після їжі;
- Кетанов (10мг) - по 1 таблетці при болях;
- При потребі пробіотик (Лінекс)

Що може зашкодити імпланту (перші 2 тижні?)




- Користування у перший місяць електричними зубними щітками;
- Вживання твердої їжі
- Перепади температур
- Надмірні фізичні навантаження
- Перепади температур
- Вживання алкоголю, гарячої або холодної їжі
- Тютюнопаління (якщо неможливо відмовитись повністю, слід скоротити кількість цигарок до мінімальної)

Як правильно доглядати за ротовою порожниною після імплантації?



На 4-й день незначне полоскання ротової порожнини (Perio-Aid 0,12%/Хлоргекседин Дента 0,12%) впродовж 60 секунд, 2 рази на День після чищення зубів м'якою щіткою із Додаванням зубної пасти.

“Червоні прапорці” або загрозливі симптоми при яких необхідно терміново звернутись до лікаря:



- біль, набряк щоки, оніміння, що тривають більше 7 днів або посилюються;
- підвищення температури тіла на 5 день після імплантації;
- кровотеча з ясен, що не зупиняється;
- розійшлися шви;
- з'явилась рухливість імпланту, скол зубної коронки.

Вищенаведені ознаки можуть свідчити про розвиток ускладнень, тому при появі будь-якого з них, слід терміново сповістити лікаря-стоматолога та звернутися на огляд!



+38 (067) 000 21 87
0443344100
www.parodent.com.ua